



新刊 2012年6月発売 新・がん化学療法のためのお薬説明書



編集・執筆：国立がん研究センター東病院薬剤部

印刷用CD-ROM

Word, PDF形式添付

定価2,625円（本体2,500円＋税）
ISBN978-4-946344-17-6

国立がん研究センター東病院で実際に使われている
67レジメンの患者向けお薬説明書
現場で印刷してすぐに使えるようにしました。



目次より（67レジメン）

- アフィニートル●イレッサ●グリバック●スーテント●ゼローダ●ゼローダ+タイケルブ●タルセバ●**ティーエスワン**●ネクサバル●ユーエフティ●ユーエフティ・ユーゼル●5-FU+トLV（5-FU+レボホリナート）●ABVD（ドキシソルピシン塩酸塩+ブレオ+エクザール+ダカルバジン）●AC（ドキシソルピシン塩酸塩+エンドキサン）●AMR（カルセド）●BEP（ブレオ+エトポシド+シスプラチン）●CBDCA+ETP（カルボプラチン+エトポシド）●CBDCA+PTX（カルボプラチン+パクリタキセル）●CBDCA+PTX+BV（カルボプラチン+パクリタキセル+アバスチン）●CDDP+RT（シスプラチン+放射線）●CDDP+CPT-11（シスプラチン+イリノテカン）●CDDP+DTX（シスプラチン+タキソテール）●CDDP+ETP（シスプラチン+エトポシド）●CDDP+GEM（肺がん：シスプラチン+ジェムザール）●CDDP+GEM（膀胱がん：シスプラチン+ジェムザール）●CDDP+PEM（シスプラチン+アリムタ）●CDDP+TAI（肝動脈化学療法）●CDDP+VNR（シスプラチン+ピノレルピン）●CHOP（エンドキサン+ドキシソルピシン塩酸塩+オンコピン+プレドニン）●Cmab（アービタックス）●Cmab+CPT-11（アービタックス+イリノテカン）●CPT-11（消化器がん：イリノテカン）●CPT-11（肺がん：イリノテカン）●Doxil（ドキシル）●DTX（タキソテール）●ESHAP（エトポシド+ソル・メドロール+キロサイド+シスプラチン）●FOLFIRI（5-FU+レボホリナート+イリノテカン）●FOLFIRI+BV（FOLFIRI+アバスチン）●FOLFIRI+Pmab（FOLFIRI+ベクティビックス）●FOLFOX（5-FU+レボホリナート+エルプラット）●FOLFOX+BV（FOLFOX+アバスチン）●FP（シスプラチン day 1+5-FU day 1-4）●FP（シスプラチン day 1+5-FU day 1-5）●GEM（肺・胆膵がん：ジェムザール）●GEM（乳がん：ジェムザール）●GEM+CDDP（胆道がん：ジェムザール+シスプラチン）●GEM+タルセバ（ジェムザール+タルセバ）●Halaven（ハラヴェン）●Herceptin（ハーセプチン）●Herceptin+DTX（ハーセプチン+タキソテール）●Herceptin+PTX（ハーセプチン+パクリタキセル）●Hycamtin（ハイカムチン）●PEM（アリムタ）●Pmab（ベクティビックス）●PTX（消化器がん：パクリタキセル）●PTX（乳がん：パクリタキセル）●RTX（リツキサン）●S-1+CDDP（ティーエスワン+シスプラチン）●TC（タキソテール+エンドキサン）●Treakisym（トレアキシム）●Velcade（ベルケイド）●VNR（乳がん：ピノレルピン）●VNR（肺がん：ピノレルピン）●XELOX（ゼローダ+エルプラット）●XELOX+BV（XELOX+アバスチン）●XP（ゼローダ+シスプラチン）●XP+Herceptin（ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン）

ティーエスワンの治療をお受けになる方へ

★治療スケジュール

症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

お薬の名前	4週間	2週間
ティーエスワン (チカフル・キマツル・ チカシルカワム) 1日 mg	 朝食後 個 夕食後 個	お休み

＊合計6週間を1回の治療とする

①飲み忘れた場合には、忘れ分を服用せず、次の分から服用してください。

②飲み忘れ分を一度に飲まないで下さい。
この薬の副作用が強くなるおそれがあります。

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

＜血液検査からわかる副作用＞

白血球減少

白血球は体内へ入った細菌から守る重要な役割があり、抗がん剤の影響で白血球が少なくなると、菌やウイルスに感染しやすくなります。

⇒日頃から手洗い、うがいなどの感染対策を！白血球が少ない時期は人ごみ避けましょう。

貧血

副作用による貧血の場合、めまい、ふらつきなどの症状としてあらわれることがあります。場合によっては、鼻で出血をしたり、嘔吐をすることもあります。

血小板減少

血小板は出血した時に血を止める働きがあります。血小板が少なくなると、歯肉からの出血や内出血、鼻血などがおこりやすくなります。

⇒血小板が少ない時期は、ケガをしないように注意して下さい。

肝機能障害

肝臓の働きが低下することがあります。そのため、定期的に血液検査を行い、肝臓の働きを確認します。

⇒お酒やサプリメント、健康食品でも肝臓の働きが低下することもあります。服用中の方は、主治医に申し込んで下さい。

＜ご自身でわかる副作用＞

悪心・嘔吐・食欲不振

個人差の大きい副作用です。症状に合わせて吐き止めを使います。ただし、水分もとれない場合は病院へ連絡して下さい。

⇒食欲がなくても、水分はしっかりとるようにして下さい。

下痢

1日5回以上の排便、もしくは明らかに排便回数が増えられた場合は、下痢止めを服用して下さい。下痢止めを2回服用しても、よくなる場合は、病院へ連絡が必要です。

⇒脱水を防ぐために、下痢または軟便の時は、水分をしっかりとしましょう。

倦怠感

治療開始2、3日後に症状があらわれることがあります。また、治療が継続することで徐々に出てくることもあります。症状が強い場合には、お薬で対応することがあります。

⇒無理に動かさず、安静にして様子を見てください。

口内炎

治療開始1週間ほどで口の中や歯肉がしみる、ひりひりする、赤くなるなどの症状が出る場合があります。うがい薬や口内用の軟膏を使うことがあります。痛くて食事ができない場合は、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめにうがいや痛みを和らげるために、口の中を清潔に保って下さい。

色素沈着

抗がん剤の影響で顔や手足（特に指先や関節）、つめが黒くなる場合があります。

手足症候群

手のひらや足の裏が赤くはれたり、ヒリヒリ・チクチクすることがあります。症状が強くなると、皮膚のひび割れや水ぶくれなど日常生活に支障をきたすおそれがあります。休薬が必要な場合もあるため、痛みが強い場合には、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめに保湿剤を使って皮膚が乾燥しないように心がけましょう。

流涙（なみだ目）

★すぐに連絡をいただきたい副作用

＊「激しい腹痛」、「激しい下痢」（嘔吐）

＊「発熱（だるさ）」、「食欲不振」、「発熱」、「貧血（目の白い部分や顔や手が黄色くなる）」、「発熱」、「吐き気・嘔吐」、「めまい」（肝機能障害）

＊「階段を登ったり、少し無理をしただけで息切れがする、息苦しくなる」、「空咳が出る」、「発熱する」このような症状が急に現れる、または以前から症状があった場合は、症状が急に悪くなる。（間質性肺炎）

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。

●見開きで見やすいレイアウト

2頁印刷で見開きに

●Word形式、PDF形式でCD-ROMに

●現場で使いやすいよう配慮

●病院の入院、外来、保険薬局で使える
がん化学療法のための患者向けお薬説明書



発行：(株)薬事新報社

〒103-0023 東京都中央区日本橋

本町3-7-8 TEL. (03)3663-2641

FAX. (03)3663-2642

E-mail: teru@yakujishinpo.co.jp

ティーエスワンの治療をお受けになる方へ

★治療スケジュール

症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

お薬の名前	4週間	2週間
ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム) 1日 mg	 朝食後 個 夕食後 個	お休み

* 合計6週間を1回の治療とする

◎飲み忘れた場合には、忘れた分を服用せず、次の分から服用してください。

絶対に2回分を一度に飲まないで下さい。

この薬の副作用が強く現れるおそれがあります。

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

〈血液検査からわかる副作用〉

白血球減少

白血球は体内へ進入した細菌から体を守る重要な役割があり、抗がん剤の影響で白血球が少なくなると、菌やウイルスに感染しやすくなります。

⇒日頃から手洗い、うがいなどの感染対策を！ 白血球が少ない時期は人ごみを避けましょう。

貧血

副作用による貧血の場合、めまい、ふらつきなどの症状としてあらわれることがあります。場合によっては、薬で治療をしたり、輸血をすることもあります。

血小板減少

血小板は出血した時に血を止める働きがあります。血小板が少なくなると、歯肉からの出血や内出血、鼻血などが起こりやすくなります。

⇒血小板が少ない時期は、ケガをしないように注意して下さい。

肝機能障害

肝臓の働きが低下することがあります。そのため、定期的に血液検査を行い、肝臓の働きを確認します。

⇒お酒やサプリメント、健康食品でも肝臓の働きが低下することもあります。服用中の方は、主治医に申し出て下さい。



〈ご自身でわかる副作用〉

悪心・嘔吐・食欲不振

個人差の大きい副作用です。症状に合わせて吐き気止めを使います。ただし、水分もとれない場合は病院へ連絡して下さい。

⇒食欲がなくても、水分はしっかりとるようにして下さい。

下痢

1日3回以上の排便、もしくは明らかな排便回数の増加がみられた場合は、下痢止めを服用して下さい。下痢止めを2回服用しても、よくなる場合は、病院への連絡が必要です。

⇒脱水を防ぐために、下痢または軟便の時は、水分をしっかりとりましょう。

倦怠感

治療開始2、3日後に症状があらわれることがあります。また、治療が継続することで徐々に出てくるともあります。症状が強い場合には、お薬で対応することがあります。

⇒無理に動こうとせず、安静にして様子を見て下さい。

口内炎

治療開始1週間ほどで口の中や歯肉がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出ることもあり、うがい薬や口腔用の軟膏を使うことがあります。痛くて食事がとれない場合は、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめにうがいや歯みがきをして、口の中を清潔に保って下さい。

色素沈着

抗がん剤の影響で顔や手や足（特に指先や関節）、つめが黒くなる場合があります。

手足症候群

手のひらや足の裏が赤くはれたり、ヒリヒリ・チクチクすることがあります。症状が強くなると、皮膚のひび割れや水ぶくれなど日常生活に支障をきたすおそれがあります。休薬が必要な場合もあるので、痛みが強い場合には、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめに保湿剤を使って皮膚が乾燥しないように心がけましょう。

流涙（なみだ目）

★すぐに連絡をいただきたい副作用



- ★「激しい腹痛」、「激しい下痢」（腸炎）
- ★「倦怠感（だるさ）」、「食欲不振」、「発熱」、「黄疸（目の白い部分や顔や手が黄色くなる）」、「発疹」、「吐き気・嘔吐」、「かゆみ」（肝機能障害）
- ★「階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる」、「空咳が出る」、「発熱する」このような症状が急に現れる、または以前から症状があった場合は、症状が急に悪くなる。（間質性肺炎）

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。